

AGRESIÓN HACIA EL HUMANO

Dr. Moisés Heiblum Frid
Depto. de Etología y Fauna Silvestre
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia,
UNAM
Práctica privada en Etología Clínica

AGRESIVIDAD

Existen diferentes causas de agresión en el perro, para una función didáctica las vamos a clasificar en 2 principales grupos:

- Con causa orgánica
 - Dolor
 - Enfermedad
 - Disfunciones en neurotransmisión
 - Lesiones cerebrales
 - Sin causa orgánica:
 - Dominancia
 - Miedo
 - Protección de recursos
 - Protección al propietario
 - Territorial
 - Redirigida
 - Predatoria
 - Maternal
 - Idiopática
 - Juego

- Aprendida

La agresión aprendida puede considerarse una combinación de otras formas de agresión. La agresión en sus diferentes modalidades es el motivo más frecuente de consulta en etología clínica principalmente por las implicaciones que tiene sobre la salud pública. En general se presentan más ataques severos a niños, probablemente, esto puede deberse a que los niños por su estatura tienen una mayor cercanía con la cara del perro, además que su lenguaje corporal es mucho más intenso y sorpresivo, lo que en muchos casos

puede disparar más fácilmente algún tipo de agresión en el perro. La gran mayoría de los ataques son de perros conocidos ó con propietario.

La agresividad en el perro no depende de un único factor, sino de la interacción de muchos factores, en ocasiones difíciles de controlar. La raza es objeto de especial atención y definitivamente puede haber influencia de la raza en la agresividad del perro. Aunque debemos considerar diferencias significativas en muchos aspectos de conducta entre las diferentes razas de perros.

Determinadas razas están implicadas en un mayor número de incidentes agresivos del que les correspondería en función de su abundancia relativa en la población, lo que se determina mediante lo que se conoce como índice de peligrosidad.

Índice de peligrosidad % incidentes causados por una raza dividido entre % de población canina correspondiente a la raza

Se puede apuntar con esto, la posibilidad de que exista una correlación entre la tenencia de una determinada raza considerada “peligrosa” y ciertos rasgos sociológicos de sus propietarios. Ya que muchos dueños caminan por el mundo a través del poder que les confiere la presencia de sus perros y tienden a tener y a entrenar a perros para ser agresivos. Es importante de cualquier manera insistir en el hecho de que cualquier raza de perro puede ser potencialmente peligrosa en determinadas circunstancias y por lo tanto no se deben limitar las medidas de prevención solamente al control de determinadas razas

Análisis de riesgo

Consiste en discriminar de forma objetiva aquellos casos que pueden y deben tratarse y aquellos en que la eutanasia representa la única alternativa razonable desde el punto de vista ético y en algunos países también desde el punto de vista legal. Una vez iniciado el tratamiento el médico es corresponsable junto con los propietarios de la prevención y el establecimiento de medidas de seguridad en un perro agresivo y la seguridad humana debe ser siempre la prioridad número 1 del MVZ en cualquier tratamiento de agresividad canina.

Factores de riesgo

- Presencia de niños, ancianos o discapacitados psíquicos o físicos
- Presencia de personas con miedo al animal
- Ataques violentos
- Propietarios poco conscientes del problema

- Ataques inesperados
- Animales grandes

AGRESIVIDAD POR DOMINANCIA DIRIGIDA HACIA HUMANOS

Es un problema de tipo jerárquico entre el perro y uno ó más de sus propietarios.

Otras denominaciones:

- Agresividad competitiva o jerárquica
- Sociopatías
- Agresividad por impulso con componente de ansiedad

Origen

Especie cuya conducta social posee una estructura jerárquica y cuya formación se basa en relaciones de dominancia y subordinación entre sus miembros. El miembro dominante tiene acceso prioritario a recursos que considera valiosos.

Una vez establecida la relación de dominancia, se mantiene a través de un lenguaje ritualizado de dominancia y sumisión, donde hay un individuo que presenta señales de dominancia y un individuo que responde con señales propias de sumisión manteniendo de esta forma una cierta armonía en la convivencia, cuando existe una comunicación deficiente se puede dar una lucha real, cuyo vencedor ve reafirmada su dominancia.

Entorno doméstico

Como resultado del proceso de socialización con el hombre, el perro muestra pautas de conducta social y comunicación similares a las que muestra con otros perros, por lo que se hace muy importante enseñarle al dueño a interpretar y comunicarse adecuadamente con el animal y a establecer reglas de convivencia que fomenten el liderazgo positivo del humano en la convivencia diaria

Presentación clínica y diagnóstico

Es más común en machos adultos de 12-36 meses de edad, lo que coincide con la etapa de madurez social, aunque la edad de presentación depende de la tolerancia del dueño y su capacidad para identificar las primeras señales de agresividad

Blanco de agresividad

Aparece hacia ciertas personas con las que el perro convive normalmente, es decir miembros de su grupo social, el perro no acepta plenamente la autoridad de sus propietarios, en situaciones específicas que reten el rango social dominante del perro. Ocasionalmente, aunque es menos común, también se presenta agresión por dominancia hacia personas que no forman parte del grupo

Contexto de agresividad

- Acercarse o intentar tocar al perro mientras come o sostiene un objeto que considera de su propiedad.
- Establecer contacto visual directo con el perro
- Inclinarsse sobre el perro o empujarlo
- Castigarlo física o verbalmente
- Molestarlo o intentar desplazarlo de su lugar de descanso
- Intentar colocarle correa, collar o bozal
- Intentar sujetarlo o inmovilizarlo físicamente
- Cepillarlo, bañarlo, medicarlo
- Acariciarlo cuando no lo pide

No es necesario que el perro reaccione de forma agresiva en todas las situaciones indicadas previamente para tener un diagnóstico de agresión por dominancia.

Es importante diferenciar la agresión por protección de recursos, la cual puede estar relacionada con la agresión por dominancia, pero también puede ser una categoría independiente así como la agresividad por dolor en caso de manipulación física.

Otras conductas típicas de un animal dominante

- Apoyar las patas delanteras sobre la persona
- Bloquear con el cuerpo el desplazamiento de la persona
- Gruñidos espontáneos en respuesta a desafíos que el dueño no es capaz de identificar
- Establecer contacto visual directo con la persona
- Nunca presenta o se resiste a posturas de sumisión

Diagnóstico

- Forma típica
 - o Elementos fáciles de identificar
- Problema complejo
 - o Presentaciones variables
 - o Impulsividad

- Las señales de amenaza se encuentran disminuidas o ausentes.

La cronificación y el aprendizaje suprimen los elementos de amenaza en la secuencia agresiva.

Hay algunas razas con mayor predisposición y tendencia a la impulsividad, por ejemplo: cocker spaniel dorado.

Niveles altos de agresividad e impulsividad están relacionados con bajos niveles de serotonina

- Ansiedad: Cuando no existe resolución del conflicto jerárquico con los propietarios

Por ejemplo: El perro es dominante en algunas situaciones y sumiso en otras.

Esto puede relacionarse con castigo físico aplicado incorrectamente.

Las posturas del perro incluyen señales ambivalentes con señales mezcladas de agresión ofensiva y miedo.

Diagnósticos diferenciales

- Agresividad relacionada con hipotiroidismo
- Hidrocefalia
- Liscencefalia
- Intoxicación
- Síndrome de agresión por lapsus mental o agresión idiopática
- Tumores intracraneales

Tratamiento de agresividad por dominancia dirigida al humano

- Descartar otros problemas que puedan influir en el desencadenamiento de la agresión
- Descartar causas orgánicas
- Hacer un análisis de riesgo
- Castración
 - No está plenamente demostrado aunque se sabe que sí existe una facilitación hormonal.
 - La expectativa con la castración es que si no lleva mucho tiempo de iniciado el problema, puede haber una mejoría, aunque difícilmente implica una cura completa.
 - Ante la duda es mejor castrar.

Está contraindicado en hembras a menos que el contexto de agresión coincida específicamente con los periodos de celo

Modificación de conducta

1. - Evitar en lo posible cualquier situación que pueda desencadenar un episodio agresivo
 - No molestarlo mientras duerme o descansa
 - Evitar juegos que parezcan luchas
 - Poner su comida en donde pueda comer solo
 - Eliminar el castigo físico o verbal

- No manipular o forzar al perro físicamente
- 2. - Reforzar el papel dominante de los propietarios sobre el perro
 - Suprimir durante una semana cualquier tipo de caricia o afecto
 - Usar la obediencia como un mecanismo de control cotidiano
 - Programa de salario
 - Alimentar al perro después de los dueños
 - Utilización de accesorios de control como collar de cabeza, correa y bozal, La utilización de fármacos en agresividad por dominancia está restringida a:
Impulsividad y/o ansiedad
 - Benzodiazepinas están contraindicadas por su efecto desinhibitorio sobre la agresión.